

BOVISTART

Aliment complémentaire prêt à l'emploi destiné aux veaux nouveau-nés

PROPRIÉTÉS:

BOVISTART apporte aux veaux nouveau-nés, les éléments indispensables dès les premières heures de vie :

- de l'énergie sous forme de sucres très assimilables et d'acides gras essentiels.
- toutes les vitamines indispensables à la vitalité du veau nouveau-né.
- une bactérie lactique naturelle issue de la flore digestive, stimulant la croissance de l'animal et favorisant une bonne implantation de la flore lactique dès les premières heures de vie.
- du colostrum pour renforcer les défenses naturelles garantes de la bonne santé des veaux nouveau-nés.

COMPOSITION:

Ovoproduits

Huile de foie de morue

Lactose

Colostrum (indemne IBR)

Dextrose

Eau

CONSTITUANTS ANALYTIQUES:

Humidité: 48 % Protéine brute: 8,6 % Cellulose brute: 0,2 %

Matières grasses brutes : 23 %

Cendres brutes (matières minérales) : 1,5 %

Sodium: 0,16 %

ADDITIFS:

Micro-organismes:

4b1705 Enterococcus facium NCIMB-10415: 10¹¹ UFC/kg

Vitamines:

3a672c Vitamine A: 1 250 000 UI/kg 3a671 Vitamine D3: 450 000 UI/kg 3a700 Vitamine E: 1 000 UI/kg 3a300 Vitamine C: 6 500 mg/kg 3a820 Vitamine B1: 250 mg/kg Vitamine B2: 1 000 mg/kg

Conservateurs Antioxygènes :

E310 Gallate de propyle : 60 mg/kg

E320 Butylhydroxyanisol (BHA): 30 mg/kg

Substances aromatiques:

Mélange de substances aromatiques

MODE D'EMPLOI:

BOVISTART est une pâte orale prête à l'emploi et facile d'utilisation grâce à sa seringue.

Il se distribue par voie orale au veau nouveau-né:

- une seringue par veau dans les premières heures suivant la naissance.
- pour les veaux les plus faibles, ne tétant pas, ne buvant pas ou ayant eu une naissance difficile, distribuer une seconde seringue.

Une seringue de **BOVISTART** peut également être préconisée aux veaux plus âgés qui manqueraient de vigueur, pour un effet « coup de fouet ».

BOVISTART peut également être utilisé pour les agneaux à raison d'une seringue pour 2 agneaux.

PRÉSENTATION:

Boîte de 6 seringues (15 ml)

CONSERVATION:

- A utiliser de préférence 12 mois après la date de fabrication.
- Se conserve entre 10 et 20°C.





