


ENVIREX +

Einstreupulver

**Desinfizierendes, pH-
neutrales Einstreupulver
mit starkem
Absorptionsvermögen**



ENVIREX+

Desinfizierendes, pH-neutrales Einstreupulver mit starkem Absorptionsvermögen



EIGENSCHAFTEN

- **Desinfizierendes Einstreupulver**
- Auf Basis eines **Mineralkomplexes und 2% VIREX**
- **Absorbiert nachweislich mehr als 120% seines Eigengewichts**, d.h. fast dreimal so viel wie Kalk
- **Neutraler pH-Wert** (8 +/- 0,5), d.h. greift weder die Hände des Bedieners, noch die Haut, Zitzen oder Klauen der Kühe an
- **Klebt nicht an der Einstreu oder an der Haut**
- **Frisches, langanhaltendes Frühlingsaroma**
- **Fängt Gerüche ein:** Starke Reduzierung des Ammoniakgeruches

WIRKSAMKEIT




Pulver

Desinfektion

++++

Absorptionsrate

+++++




Zulassung : CHZN5956

BAKTERIZIDE WIRKUNG

Angepasstes Protokoll der Norm EN 14349
hoher Verschmutzungsgrad
120 Min. bei 10°C und 30°C - 300g/m²

Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus uberis, Enterococcus hirae, Proteus hauseri, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

Aufnahmefähigkeit versus Zeit



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Streuung von Hand oder mechanisch, regelmäßig erneuern:

- **Tiefstreställe mit Stroh:** Verteilung nach Stroheinstreuung: Desinfektionsmitteldosis: 300 g/m² 2-3 Mal pro Woche
- **Liegeboxen:** 300 g/m² 2-3 Mal pro Woche (im hintersten Drittel der Box)
- **Abkalbeboxen:** 300 g/m² nach der Reinigung direkt auf den Boden
- **Kälbernischen und -boxen:** 300 g/m² nach der Reinigung direkt auf den Boden, danach 1 Anwendung pro Woche nach Einstreuung mit Stroh

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Kersia Ansprechpartner